

COMUNICACIONES ZOOLOGICAS DEL MUSEO DE HISTORIA NATURAL DE MONTEVIDEO

Número 135

1972

Volumen X

NOTAS SOBRE FELIDOS NEOTROPICALES, V.

NUEVA AMPLIACION DE LA DISTRIBUCION DEL GATO EIRA EN PATAGONIA

por

ALFREDO XIMÉNEZ

Actualmente, las áreas de distribución de los félidos sudamericanos, se reducen constantemente a causa de la persecución de que son objeto sus individuos. Fundamentalmente, el alto valor comercial de sus pieles, influye para que las poblaciones se vean disminuídas en número, cuando no diezmadadas.

Sin embargo, últimamente y en base a un especímen, hemos comprobado la presencia de *Felis (Herpailurus) yagouaroundi* GEOFFROY, 1803 al oeste de Viedma, República Argentina, hacia los 41° de latitud sur. Este hecho no dejó de sorprendernos dado que la cita más austral para la especie estaba fijada primeramente en los 36° de latitud sur, en la provincia de Mendoza (MINOPRIO y MENENDEZ, 1952) y más tarde en los 39° de latitud sur (CRESPO, 1959).

El escaso valor que se le adjudica a la piel de este felino, es probablemente uno de los factores que ha influido, para que la especie haya podido alcanzar en su desplazamiento, la estepa patagónica sobre la costa atlántica.

Dejamos constancia de nuestro reconocimiento al Dr. Jorge Crespo del Museo Argentino "Bernardino Rivadavia" y así mismo al Ing. Agr. Alberto Crespo, por el apoyo que nos proporcionaron cuando realizamos el viaje a Carmen de Patagones. Nuestro sincero agradecimiento al Sr. Cándido Rafael Campano, residente de Viedma, por la desinteresada ayuda que nos brindó durante nuestra estancia en dicha localidad.

El ejemplar al que hacemos referencia es una hembra procedente de San Antonio, localidad situada en la costa norte del Golfo de San Matías, en la provincia de Río Negro, y fue capturado en el

mes de marzo del año 1971. Se conserva sólo la piel en la colección de mamíferos del Museo Nacional de Historia Natural, Montevideo, Uruguay con el N° 2468. El color de esta piel, que corresponde a la fase rojiza de la especie, coincide en su tonalidad con la descripción proporcionada por Cabrera (1961:235) para un espécimen procedente de Catamarca y que dicho autor adjudica a la subespecie *F.y.ameghinoi* HOLBERG, 1898. Dadas estas características y como quiera que las subespecies de *Felis yagouaroundi* sólo se diferencian en matices de coloración no muy bien definidos, adjudicamos en principio a esa subespecie, el gato eirá de Patagonia, ampliando de esta manera la distribución de la especie hacia el sur del continente.


La demarcación de las áreas de dispersión de las subespecies, *F.y.eyra* G. FISCHER, 1814 y *F.y.ameghinoi*, HOLBERG, 1898 que se muestra en el mapa I, se basa en la distribución "totalmente provisional" que le adjudica CABRERA (1961) a ambas formas. La única modificación que hemos introducido, es el no haber incluido dentro del área de dispersión de *F.y.eyra* al territorio uruguayo, por no existir pruebas hasta el presente de la presencia del yaguarundí en el mismo.

DEVINCENZI (1935:48) al referirse al yaguarundí como habitante del Uruguay dice: "que la proporción en que se encuentra con relación a los otros félidos es insignificante", indicando que sólo pudo estudiar algunas pieles procedentes de las sierras de Minas, Depto. de Lavalleja. Estas pieles no fueron conservadas en las colecciones del Museo Nacional de Historia Natural de Montevideo, ni registradas en catálogo.

CHEBATAROFF y GERZENSTEIN (1965:307), sin mencionar ejemplares citan al gato eirá en forma "dudosa" para la sierra Mahoma, Depto. de San José, Uruguay. Finalmente, y sin descartar la posibilidad de que este félido pueda ser hallado en el Uruguay, debemos decir que es frecuente que a los ejemplares melánicos de *Felis geoffroyi paraguayae* (Pocock, 1940) se los denomine en este país con los nombres comunes de yaguarundí o gato eirá.

BIBLIOGRAFIA

- CABRERA, A. — 1961. Los Félidos vivientes de la República Argentina. Rev. Mus. Arg. Cienc. Nat., 6(5):161-247.
- CRESPO, J. — 1959. Presencia del gato yaguarundí (*Felis yagouaroundi ameghinoi* Holberg) en las provincias de Río Negro y Buenos Aires. Neotropica, 5(16):12.
- CHEBATAROFF, J. y E. GERZENSTEIN. — 1965. Observaciones ecológicas sobre la avifauna de la Sierra Mahoma. An. 2do. Cong. Lat. Amer. Zool., São Paulo, 2: 305-312.
- DEVINCENZI, G. J. — 1935. Mamíferos del Uruguay. Anales Mus. Hist. Nat. Montevideo, Ser. II, 4 (10): 1-96, láms. I-XII.
- MINOPRIO, J. L. e I. MENÉNDEZ. — 1952. Dispersión austral del llamado gato Eyrá. An. Soc. Cient. Argentina, 153(6):227-229, 1 fig.



Mapa I.

- a) Zona rayada vertical: área de distribución de la forma *F.y.ameghinoi*.
Zona negra: ampliación de la misma mencionada en el texto.
- b) Zona rayada horizontal: distribución de la subespecie *F.y.eyra*.

Comisión del Papel - Edición amparada por el Art. 79 de la Ley N° 13.349.

Depósito Legal N° 29.163/72

IMPRESORA URUGUAYA COLOMBINO S. A. - Juncal 1511 - Montevideo
Agosto, 1972