

Thripophaga pyrrholeuca pyrrholeuca (VIELLOT).

Canastero chico.

Sylvia pyrrholeuca VIELLOT, 1817, Nouv. Dict. Hist. Nat., nouv. éd., 11: 277 (Basado en AZARA No. 231 "Cola aguda acanelado y blanquizeo"): Paraguay.

Asthenes pyrrholeuca pyrrholeuca CORY-HELLMAYR, 1925, 4: 133; PETERS, 1951, 7: 103; PALERM, 1962 (Reunión de Com. Soc. Zool. del Uruguay, 23 de marzo); idem, 1971: 46 (primera mención para el Uruguay).

Distribución: La forma nominal de *T. pyrrholeuca* se distribuye por las Prov. de Santa Cruz, Chubut, Río Negro y el extremo sur de Buenos Aires. En otoño migra hasta Santa Fe y Entre Ríos. Fuera de Argentina se extiende hasta Paraguay y Uruguay.

Notas: Hasta el presente, el único registro de esta especie para territorio uruguayo, es el mencionado por PALERM, (op. cit.). Se trata de un ♂ adulto, obtenido el 19 de abril de 1953, en el arroyo Cufre, cerca de la Ruta 1, Dpto. de Colonia.

Phacellodomus sibilatrix SCLATER.

Espinero chico.

Phacellodomus sibilatrix SCLATER, 1879, Proc Zool. Soc. London: 461 (Córdoba, Argentina; según CORY-HELLMAYR, 1925: 162).

Phacellodomus sibilatrix CORY-HELLMAYR, 1925, 4: 162; PETERS, 1951, 7: 111; GERZENSTEIN, 1965 a: 281 (primera cita para el país).

Distribución: Vive en la parte central del Paraguay y norte de Argentina, en las Prov. de Salta, Formosa, Corrientes, Entre Ríos hasta Santa Fe, Córdoba y el norte de Buenos Aires; también en el suroeste del Uruguay (Dptos. de Colonia y Soriano).

Notas: La especie es sedentaria en el Uruguay y a los cuatro ejemplares mencionados por GERZENSTEIN (op. cit.), hay que agregar otros seis (cuatro ♀ y dos ♂) de la Colecc. Guazubirá. También proceden del oeste del Dpto. de Colonia, Estancia "San Jorge", arroyo Limetas, Martín Chico, y fueron obtenidos en los meses de marzo, abril y septiembre.

Pseudoseisura lophotes argentina PARKES.

Caserote.

Pseudoseisura lophotes argentina PARKES, 1960, The Auk, 77: 227 (La Cocha, Tucumán, Argentina).

Pseudoseisura lophotes (no de REICHENBACH) TREMOLERAS, 1920: 20; CORY-HELLMAYR, 1925, 4: 168-169; WETMORE, 1926: 281; PETERS, 1951, 7: 122; CUELLO Y GERZENSTEIN, 1962: 120.

Distribución: Se distribuye por Argentina desde Catamarca, Tucumán y Santiago del Estero hasta la Pampa y Mendoza. En invierno migra hasta Salta, Formosa, Corrientes y Entre Ríos ? (OLROG, 1963: 225). También vive en Paraguay y Uruguay.

Notas: En el Uruguay es sedentaria. Frecuenta árboles y matorrales espinosos en la parte marginal de los montes. Ha sido registrada en los Dptos. de Artigas, Salto, Paysandú, Río Negro (zona de Bopicuá, anidando, 8 de diciembre de 1971), Durazno, Florida, Lavalleja, San José y Canelones.

Según PARKES (op. cit.), la forma nominotípica es de Guanacos, Prov. de Santa Cruz, Bolivia.

Familia COTINGIDAE

Pachyrampus viridis viridis (VIEILLOT).

Añambé verde.

Tityra viridis VIEILLOT, 1816, Nouv. Dict. Hist.Nat., nouv. éd. 3: 348 (Basado en AZARA, No. 210 "Caracterizado verde corona negra"): Paraguay.

Pachyrampus viridis viridis HELLMAYR, 1929, 6: 164-165.

Distribución: La dispersión geográfica de esta forma comprende el sur y el este de Bolivia, Paraguay, norte de Argentina, sur, este y centro del Brasil y Uruguay.

Notas: El hallazgo de un ejemplar de esta especie en el noreste del Uruguay, permite citarla por primera vez. Se trata de un ♂ adulto, No. 04141, M. N. H. N., y procede de la Estancia "Santa Inés", 4 Km. al oeste de Paso del Dragón, Río Tacuarí, Dpto. de Cerro Largo, 30 de junio de 1974, col. A. Ximénez, J. González y F. Silva.

Familia TYRANNIDAE¹⁰

Muscisaxicola macloviana macloviana (GARNOT).

Dormilona de cabeza parda.

Sylvia macloviana GARNOT, 1829, Voy. Coquille, Zool. 1: 540 ("Islas Malvinas, en los alrededores de la Bahía de l'Huile del Puerto Duperrey y los valles que rodean l'Aiguade").

Muscisaxicola macloviana macloviana CORY-HELLMAYR, 1927, 5: 29.

Muscisaxicola macloviana GERZENSTEIN, 1965b: 245 (primer registro para el Uruguay); GEPP, 1973: 222.

¹⁰ MEYER DE SCHAUENSEE (1966:358) considera a *bellicosa* (VIEILLOT) 1819 como subespecie de *ferruginea* (GMELIN) 1788. Por tanto, el nombre de nuestra "Viudita colorada" es *Hirundinea ferruginea bellicosa* (VIEILLOT).

Distribución: Se distribuye por Argentina desde Catamarca, Tucumán y Santiago del Estero hasta la Pampa y Mendoza. En invierno migra hasta Salta, Formosa, Corrientes y Entre Ríos ? (OLROG, 1963: 225). También vive en Paraguay y Uruguay.

Notas: En el Uruguay es sedentaria. Frecuenta árboles y matorrales espinosos en la parte marginal de los montes. Ha sido registrada en los Dptos. de Artigas, Salto, Paysandú, Río Negro (zona de Bopicuá, anidando, 8 de diciembre de 1971), Durazno, Florida, Lavalleja, San José y Canelones.

Según PARKES (op. cit.), la forma nominotípica es de Guanacos, Prov. de Santa Cruz, Bolivia.

Familia COTINGIDAE

Pachyramphus viridis viridis (VIEILLOT).

Añambé verde.

Tityra viridis VIEILLOT, 1816, Nouv. Dict. Hist.Nat., nouv. éd. 3: 348 (Basado en AZARA, No. 210 "Caracterizado verde corona negra"): Paraguay.

Pachyramphus viridis viridis HELLMAYR, 1929, 6: 164-165.

Distribución: La dispersión geográfica de esta forma comprende el sur y el este de Bolivia, Paraguay, norte de Argentina, sur, este y centro del Brasil y Uruguay.

Notas: El hallazgo de un ejemplar de esta especie en el noreste del Uruguay, permite citarla por primera vez. Se trata de un ♂ adulto, No. 04141, M. N. H. N., y procede de la Estancia "Santa Inés", 4 Km. al oeste de Paso del Dragón, Río Tacuarí, Dpto. de Cerro Largo, 30 de junio de 1974, col. A. Ximénez, J. González y F. Silva.

Familia TYRANNIDAE¹⁰

Muscisaxicola macloviana macloviana (GARNOT).

Dormilona de cabeza parda.

Sylvia macloviana GARNOT, 1829, Voy. Coquille, Zool. 1: 540 ("Islas Malvinas, en los alrededores de la Bahía de l'Huile del Puerto Duperrey y los valles que rodean l'Aiguade").

Muscisaxicola macloviana macloviana CORY-HELLMAYR, 1927, 5: 29.

Muscisaxicola macloviana GERZENSTEIN, 1965b: 245 (primer registro para el Uruguay); GEPP, 1973: 222.

¹⁰ MEYER DE SCHAUENSEE (1966:358) considera a *bellicosa* (VIEILLOT) 1819 como subespecie de *ferruginea* (GMELIN) 1788. Por tanto, el nombre de nuestra "Viudita colorada" es *Hirundinea ferruginea bellicosa* (VIEILLOT).

Distribución: Nidifica en las islas Malvinas. Durante el invierno se extiende hasta Buenos Aires, Entre Ríos y el Uruguay.

Notas: Las citas de GERZENSTEIN (op. cit.), costa rocosa del Dpto. de Montevideo, en el mes de mayo y GEPP (op. cit.), julio de 1968 en las cercanías del Puerto de Montevideo y 19 de agosto del mismo año para la Sierra de Animas, Dpto. de Maldonado, están basadas en registros visuales. Aunque carecemos de material capturado en el país, las fotografías obtenidas por Gepp, nos permiten adjudicar estas menciones a la subespecie nominal.

Serpophaga subcristata straminea (TEMMINCK).

Piojito de vientre amarillo.

Muscicapa straminea TEMMINCK, 1822, Nouv. Rec. Pl. Color., livr. 28, pl. 167, fig. 2 ("Bresil" Coll. NATTERER = Ypanema, Sao Paulo, Brasil).

Serpophaga subcristata TREMOLERAS, 1920: 21; WETMORE, 1926: 318; CORY-HELLMAYR, 1927, 5: 382-383.

Serpophaga subcristata subcristata CUELLO Y GERZENSTEIN, 1962: 136.

Serpophaga subcristata straminea PALERM, 1971: 58-61 (primera cita para el Uruguay).

Distribución: Se extiende por la parte suroriental del Brasil, desde Piauí y Bahía hasta Río Grande do Sul y Uruguay.

Notas: PALERM (1971) en un documentado estudio sobre las subespecies de *S. subcristata*, para el que dispuso del material existente en colecciones nacionales, llega a la conclusión de que la forma sedentaria en el Uruguay es la descrita por TEMMINCK. Al mismo tiempo, menciona como posible la ocurrencia de *S. subcristata subcristata* durante el verano, especialmente en el litoral occidental del país.

Serpophaga munda (BERLEPSCH).

Piojito de vientre blanco.

Serpophaga munda BERLEPSCH, 1893, Orn. Monatsber., 1: 12 (Samaipata, Valle Grande y Olguín, Santa Cruz, Bolivia).

Serpophaga munda CORY-HELLMAYR, 1927, 5: 384-385.

Serpophaga subcristata munda PALERM, 1971: 58-61 (primera mención para el país).

Distribución: Vive en el norte de Argentina hasta La Pampa; migrando hasta Bolivia, Paraguay, Uruguay y parte central del Brasil.

Notas: La mención de PALERM (op. cit.) tiene como base el ejemplar No. 1273 de su colección particular. Se trata de un ♂, y fue obtenido el 28 de setiembre de 1962 en Punta del Rodeo, Cerro, Dpto. de Montevideo. También cita registros visuales (14 de setiembre y

3 de octubre) Punta del Rodeo y Sayago, Dpto. de Montevideo. De acuerdo con las fechas de referencia y la opinión del mismo autor, *S. munda* alcanza el territorio uruguayo en sus desplazamientos migratorios hacia el sureste.

Elaenia albiceps chilensis HELLMAYR.

Fio-fio chileno.

Elaenia albiceps chilensis HELLMAYR, 1927, Field Mus. Nat. Hist. Zool. Ser., 13(5): 413-414 (Curacautín, Malleco, Chile).

Elaenia albiceps chilensis PALERM, 1973: 176-178 (primera cita para el Uruguay).

Distribución: Nidifica en Chile desde Atacama a Tierra del Fuego y en Argentina desde Buenos Aires y Córdoba hasta el sur de Tierra del Fuego e isla de los Estados. En otoño migra al norte y se extiende hasta la costa atlántica, por el centro del Perú (BRACK EGG, 1972: 157) y toda la región brasileña al sur del Amazonas.

Notas: La inclusión de esta forma¹¹ en la fauna uruguaya está confirmada con las menciones de PALERM (op. cit.); zona del Prado, Dpto. de Montevideo, 20 de abril de 1962 y Carrasco, Dpto. de Montevideo, 19 de abril de 1968. El referido autor, opina que esta subespecie¹² no inverna en el país y que los individuos registrados son transeúntes, criterio que también fuera sustentado por PARTRIDGE (1953:2) con referencia a las citas para el Paraguay.

Camptostoma obsoletum obsoletum (TEMMINCK).

Piojito pardo y gris.

Muscicapa obsoleta TEMMINCK, 1824, Nouv. Rec. P. Color., pl. 275, fig. 1 (Brésil = Curitiba, Brasil; según HELLMAYR, 1908: 43).

Camptostoma obsoletum obsoletum CORY-HELLMAYR, 1927, 5: 454-455; BARLOW Y CUELLO, 1964: 517 (primera mención para el Uruguay).

Distribución: La forma nominal de *C. obsoletum* se extiende por el Paraguay, sureste del Brasil, Misiones, Corrientes, este de Formosa, Chaco, norte de Santa Fe y Entre Ríos en Argentina, Artigas y Rivera en el Uruguay.

11 Las citas de MEYER DE SCHAUENSEE, 1966:380 y 1970:319 donde se incluye al Uruguay en el área de distribución de la especie, provienen de la mención de Philippi, 1964:150. ver PALERM (op. cit.).

12 Según OLRG, 1963:269, nota al pie, las distintas razas de *E. albiceps*, con la excepción de *modesta* TSCHUDI, 1844; forma que vive en la zona costera del Perú, desde Cajamarca a Tacna y norte de Chile, han sido creadas en base a caracteres individuales o plumajes estacionales. Al mismo tiempo sugiere la posibilidad de que *E. parvirostris* PELZELN, 1868, sea una subespecie de *albiceps* (Lafresnaye y d'Orbigny, 1837).

Notas: Hasta el presente, los únicos hallazgos de esta especie en territorio uruguayo, son los mencionados por BARLOW y CUELLO (op. cit.); gajo norte del arroyo Laureles, oeste del Dpto. de Rivera, 15 de abril de 1962 y GERZENSTEIN, 1965:282, San Gregorio, Dpto. de Artigas, 2 de marzo de 1960. Ambos registros corresponden al verano, por cuya razón, habrá que esperar nuevos datos para determinar con seguridad si se trata de un ave sedentaria en el país, o si por el contrario es migratoria, como lo hacen suponer las referidas fechas de captura.

Familia *HIRUNDINIDAE*

Riparia riparia riparia (LINNÉ).

Golondrina barranquera norteamericana.

Hirundo riparia LINNÉ, 1758, Syst. Nat., 10 ed. 1: 192 (Suecia).

Riparia riparia riparia HELLMAYR, 1935, 8: 63-65; PETERS, 1960, 9: 97-98.

Distribución: Se reproduce en Norteamérica desde Alaska y el norte del Canadá hasta el sur de los Estados Unidos; también en Europa y Siberia. Migra hasta Africa y la India y por Centro y Sudamérica desde México hasta Argentina y Uruguay.

Notas: Fue registrada visualmente en el lago del Parque Lecocq, Dpto. de Montevideo, agosto de 1974 (Comunicación personal de los ornitólogos Alfredo y Peter Gepp).

Familia *TROGLODYTIDAE*

Troglodytes aëdon chilensis LESSON.

Ratonera.

Troglodytes chilensis LESSON, 1830, Voyage "Coquille", Zool., 1(2), 1826-1830: 665 (La Concepción = Concepción, Chile).

Troglodytes musculus chilensis HELLMAYR, 1934, 7: 238-240.

Troglodytes aëdon chilensis PAYNTER, 1960 in PETERS, 9: 427; PALERM, 1973: 175-177 (primera cita para el Uruguay).

Distribución: Anida en Chile, desde Coquimbo hasta Tierra del Fuego y de allí por Argentina hasta Mendoza. Durante el invierno migra al norte hasta Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos en Argentina, Uruguay y Atacama en Chile.

Notas: El primer registro de esta subespecie en el Uruguay, es el mencionado por PALERM (op. cit.). Se trata de un ♂ adulto, capturado el 22 de agosto de 1964 en una zona de chircales, cerca de las Barrancas de Kiyú, costa del Río de La Plata, Dpto. de San José.

Familia *TURDIDAE*¹³*Turdus albicollis paraguayensis* CHUBB.

Zorzal paraguayo.

Turdus albicollis paraguayensis CHUBB, 1910, *Ibis*, 4: 608 (Sapucay, Paraguay).

Turdus albicollis paraguayensis HELLMAYR, 1934, 7: 366-367; RIPLEY, 1964 in PETERS, 10: 225.

Distribución: Habita en el este del Paraguay, noreste de la Argentina (Misiones y Corrientes; SHORT, 1971:300), sureste del Brasil y noreste del Uruguay (Cerro Largo).

Notas: Los primeros ejemplares de esta forma obtenidos en el Uruguay, proceden del arroyo de La Mina, 5ª Sec. Dpto. de Cerro Largo (2 ♂ y 1 ♀, 15 y 17 de marzo de 1969). Posteriormente fue registrada en la sierra de Aceguá, Dpto. de Cerro Largo (1 ♀ y 1 ♂, 21 y 27 de marzo de 1974) y por último en la Estancia "Santa Inés", 4 Km. al oeste de Paso del Dragón, Río Tacuarí, Dpto. de Cerro Largo (2 ♂, 30 de junio de 1974 y 3 de julio del mismo año).

Familia *PARULIDAE*¹⁴*Dendroica breviunguis* (SPIX).

Arañero del Canadá.

Alauda (Anthus) breviunguis SPIX, 1824, *Av. Spec. Nov. Bras.*, 1: 75, lám. 76-77, fig. 1 ("in provinciae Parae" = Pará, Brasil).

Muscicapa striata FORSTER, 1772, *Philos. Trans.*, 62: 406, 428 (Río Severn = Fortín Severn, costa occidental de la Bahía de Hudson, Canadá).

Dendroica breviunguis HELLMAYR, 1935, 8: 403-405.

Dendroica striata PALERM, 1973: 175-176 (primera cita para el país).

Distribución: Nidifica en Alaska, Canadá y el noreste de los Estados Unidos de Norteamérica. En sus habituales migraciones invernales a Centro y Sudamérica, llega hasta el norte del Amazonas, a través de México (Tehuantepec, Oaxaca) Panamá; fide EISENMANN, 1955:91, las Antillas, Colombia, Venezuela, las Guayanas, Ecuador, Perú y Brasil. Más al sur, se conocen registros de Chile (LANDBECK, 1864: 56, fide PHILIPPI, 1964:161; cita basada en un ejemplar obtenido en 1858, en Callico, cerca de Valdivia, GIGOUX Y LOOSER, 1930:19), Ar-

13 MAYR & GREENWAY (1965:8) y RIPLEY in PETERS 1964:13, tratan a la familia *Turdidae* como subfamilia de *Muscicapidae* del Viejo Mundo.

14 PAYNTER, 1957:272, ha sugerido que *Parula pitayumi* (VIEILLOT), 1817, es una subespecie de *P. americana* (LINNÉ) 1758. Este criterio es compartido por PHILLIPS 1961:365 y 1972 (comunicación personal) y mencionado como probable por MEYER DE SCHAUSENSEE, 1966:442.