

1920, pp. 24-24 (mención de la cita de Aplin); HELLMAYR & CONOVER, 1942, I (1), pp. 419-420 (sinonimia y distribución geográfica); ARREDONDO, 1953, pp. 113-114 (mención de su presencia en el Uruguay).

Material examinado: MNHN, N.º 161. Proc.: Laguna de Rocha, Dpto. de Rocha, X-1936, col. Dr. J. M. Sosa. — MNHN, N.º 162. Proc.: Lag. del Diario, Dpto. de Maldonado, VII-1951, col. N. Rizzo. — MNHN, N.º 163. Proc.: Lag. del Cisne, Dpto. de Canelones, 21-IX-1952, col. E. Gómez-Haedo. — MNHN, N.º 1530. Proc.: Boca Rosario, Dpto. de Colonia, 12-VI-1960, col. E. Gerzenstein.

Descripción sumaria: Corona, nuca y cuello posterior: negro. Dorso superior e inferior, rabadilla, tectrices alares y caudales y cara superior de las rectrices: gris pizarra oscuro. Sobre el dorso inferior, la rabadilla y a veces también en las tectrices y la cola hay tintes oliváceos con muy variada extensión, según los ejemplares. Cara superior de las rémiges primarias: pardo muy oscuro, con los extremos de las barbas externas algo más claros; la primera primaria es unicolor en casi toda su extensión con solamente áreas muy reducidas blancas en la base; rémiges secundarias: pardo oscuro con tinte oliváceo.

Regiones superciliar, malar, loreal y auricular y lados del cuello: negro uniforme, semejante al de la corona. Flancos: gris pizarra.

Mentón, garganta y cuello anterior: negro. Pecho, abdomen y crissum: gris-pizarra progresivamente más claro hacia atrás. Tectrices alares inferiores: gris-pizarra con puntas de algunas plumas blanquecinas, cara inferior de las rémiges: gris. Tectrices caudales inferiores laterales blancas, centrales negras.

Iris: marrón-naranja, patas: verde-oliváceo, escudete y base del pico: rojo oscuro, centro y punta del pico: amarillo. En la mandíbula sólo una muy pequeña parte basal es roja (más o menos una quinta parte).

Sexos y medidas (en mm.) de los ejemplares examinados

| MNHN N.º | sexo | longitud total | ala | cola | tarso | dedo medio con uña | culmen con escudete |
|----------|-----------|----------------|-----|------|-------|--------------------|---------------------|
| 161 | indeterm. | | 176 | 59 | 48 | 81 | 50 |
| 162 | indeterm. | | 166 | 58 | 53 | 79 | 51 |
| 163 | ♀ | 385 | 174 | 59 | 50 | 84 | 49 |
| 1530 | indeterm. | 402 | 185 | 62 | 55 | 86 | 44 |

Notas: Esta especie es la más rara entre nuestras gallaretas. La hemos observado en grupos de 5 hasta 20 ejemplares en algunas lagunas próximas a la costa marítima del país, como los bañados cercanos a La Coronilla, las lagunas de Rocha, del Diario, del Sauce,

del Cisne (Ao. Tropa Vieja), y en el Parque Lecoq, a veces comunes y casi siempre con las otras dos especies del género *Fulica* ("reta"). Ejemplares aislados se encuentran también en otros lugares, así, uno fue obtenido en las viejas canteras, ahora llenas de agua, en la orilla izquierda de la Boca Rosario (Dpto. de Colonia). No se ha encontrado esta especie en el centro y norte del país.

Comentarios: TREMOLERAS Y BARATTINI no han incluido la gallareta de escudete rojo en sus listas a pesar de que el primero la menciona como especie citada por APLIN. La dificultad de identificar la gallareta es probablemente la razón por la cual faltan datos sobre su distribución y las costumbres de cada especie. Como lo anota WETMORE (1926, pp. 119-119) es difícil determinar las especies en pieles y en las cuales los colores del pico y del escudete se encuentran en raras ocasiones. Las claves de SHARPE (1894, pp. 209-210) y de SCLATER & VIN (1869, pp. 120-120) son incompletas. Las de WETMORE (pp. 119-119) prestan más datos útiles. En el cuadro siguiente se incluyen los indicios que nos parecen de valor para la determinación de las tres especies. Las medidas son tomadas exclusivamente de nuestros ejemplares.

| | <i>Fulica armillata</i> VIEILLOT | <i>F. leucoptera</i> VIEILLOT | <i>F. rufifrons</i> PHILIPPI & LANDBECK |
|---------------------------------|--|---|---|
| <i>escudete y pico</i> | amarillo con una faja roja (pareciendo negra vista de lejos) en el límite del escudete y del pico, que se para las partes amarillas. Punta del escudete generalmente redondeada. | todo amarillo, a veces con la punta del pico verdosa. Punta del escudete generalmente redondeada. | escudete y pico: rojo; parte central del pico: amarillo. Escudete rojo, terminado en una punta aguda. |
| <i>secundarias</i> | unicolores | con puntas blancas | unicolores |
| <i>primera rémige</i> | con un angosto borde blanco | con un angosto borde blanco | unicolor, a veces con la base un poco reducida blanca |
| <i>ala</i> | más de 190 mm(4)* | menos de 190 mm (3) | menos de 190 mm |
| <i>cola</i> | 49 - 56,5 (4) | 47 - 52 (3) | 57 - 62 |
| <i>tarso</i> | 58 - 72 (4) | 51 - 55 (3) | 48 - 55 |
| <i>dedo medio con uña</i> | 98 - 105 (4) | 77 - 86 (3) | 74 - 86 |

Para naturalistas jóvenes, sin gran experiencia, sería confundir a *Fulica rufifrons* PHILIPPI & LANDBECK con *Gallinula chloropus*.

* Las cifras entre paréntesis indican el número de ejemplares examinados.

chloropus galeata LICHTENSTEIN, que es mucho más común y habita el mismo biótopo —grandes lagunas de poca profundidad con mucha vegetación acuática, bordeadas de juncos y totoras—. Con el ave de cerca es imposible equivocarse por las membranas cortadas alrededor de los dedos de *Fulica* (dedos palmatílobados), mientras que *Gallinula* tiene dedos simples, no lobados. En el campo (en el agua) el indicio principal es el pico que es casi totalmente rojo en *Gallinula* con sólo la punta amarilla, mientras que en *Fulica rufifrons* sólo el escudete y la base del pico son rojos y la mayor parte de este último es amarilla. Además *Gallinula* tiene la punta superior del escudete redondeada y áreas de color blanco en las alas y el abdomen.

Arenaria interpres morinella (LINNÉ)
“revuelvepiedras”

Tringa maritima LINNÉ, 1766, 1, pp. 249-249 (Europa y Norte América).
Arenaria interpres (LINNÉ), SCOTT & SHARPE, 1910, 2 (2), pp. 254-265, fig. 144 (sinonimia y bibliografía, medidas, descripción y figura de plumaje de cría de macho, descripción de plumaje de cría de hembra, de plumaje invernal y de plumaje juvenil; distribución, etología reproductora en el hemisferio norte); BENT, 1929, 2, pp. 278-298 (inmigraciones, comportamiento reproductor), 278-293 (parte), 294-298 (migraciones, comportamiento reproductor, nidación, descripción de huevos, de pollos, de plumajes, alimentos, etología y ecología, voz, migraciones y caza, de la especie en su conjunto; distribución, áreas de cría, distribución invernal, migración de primavera y de otoño, registros ocasionales y fechas de puesta de la subespecie).

Arenaria interpres morinella (LINNÉ), MUS. ARG. C. NAT., 1936, pp. 353-353; HELLMAYR & CONOVER, 1948, 1 (3), pp. 136-139 (sinonimia, bibliografía, distribución: cría en las costas árticas e islas de Norteamérica, desde la punta Barrow a la Isla de Baffin, hacia el sur a la bahía de Bristol, el mar de Bering e Isla de Southampton; invierna en el sur de los Estados Unidos, las Antillas, las Islas Galápagos y ambas costas de Sudamérica, llegando hacia el sur hasta Chile —Isla La Mocha, Arauco— y sur del Brasil —Santa Catarina—); TEAGUE, 1955, pp. 17-18, 51-51 (observaciones en el Uruguay: un ejemplar en Punta del Este —Dpto. de Maldonado—; fotografía en la pág. 51; 10 ejemplares en la Isla Grande, La Paloma, Dpto. de Rocha, el 12-XII-1951 y el 15-XII-1951).

Material examinado: ZVC, A. 94. Proc.: Cabo Polonio, Dpto. de Rocha, 21-IX-1953, col. R. Vaz-Ferreira y B. Orejas. — ZVC, A. 386. Proc.: Cabo Polonio, Dpto. de Rocha, 9-II-1955, col. Excursión ZVC. — MNHN, N.º 1219. Proc.: Cabo Polonio, Dpto. de Rocha, 9-II-1955, col. Exc. ZVC. — MNHN, N.º 1562. Proc.: Santa María, Dpto. de Rocha, 29-I-1961, col. R. Saccone.

Descripción sumaria: Porciones superiores de la cabeza, cuello posterior y dorso superior con plumas de centro pardo oscuro y bordes gris-pardo. Dorso inferior y tectrices caudales superiores: blanco; una

faja de plumas pardo-oscuro implantada en la rabadilla separa dos zonas blancas mencionadas. Cara superior de rectrices caudal blanco hasta algo más de la mitad de su longitud, pardo-oscuro en porción subterminal y blanco en el extremo. Tectrices alares superiores: pardo con el raquis pardo oscuro y el borde pardo claro. Cara superior de las rémiges: pardo con raquis blanco.

Regiones loreal y auricular: pardo-dorado; mejillas, región mandibular y cuello lateral con fondo blanco y manchas pardo-oscuro. Flancos cubiertos adelante con plumas pardo muy claro en la base y pardo oscuro en el tercio terminal, y en su parte posterior enteramente blancos.

Mentón, garganta y porción superior mediana del cuello anterior blanco. Pecho superior ocupado por una franja transversa de plumas con base blanca, proximidad del extremo: pardo oscuro y extremo blanquecino. Dicha franja es más alta en las porciones laterales del pecho y se reduce considerablemente en la porción mediana. Pecho inferior, vientre, región tibial, tectrices caudales y alares inferiores blanco. Cara inferior de las rectrices: blanco desde la base hasta el tercio terminal, y en el extremo de dicho tercio; parte principal del tercio terminal: pardo en extensiones decrecientes a medida que se acerca a la rectriz es más externa.

Cara inferior de las rémiges: blanco en la base y el raquis, y el resto pardo, progresivamente más oscuro hacia el ápice.

Pico: negro. Patas: rojo vinoso. Iris: gris.

Sexos y medidas (en mm.) de los ejemplares examinados

| ZVC, A. N.º | sexo | longitud total | ala | cola | tarso | dedo medio con uña |
|-----------------|------|----------------|-----|------|-------|--------------------|
| 94 | ♀ | 220 | 140 | 59 | 26 | 28 |
| 386 | ♂ | 220 | 152 | 62 | 26 | 26 |
| <i>MNHN N.º</i> | | | | | | |
| 1219 | ♀ | 216 | 146 | 60 | 25 | 28 |
| 1562 | ♀ | 250 | 149 | 62 | 26 | 29 |

Notas: Pequeñas bandadas de chorlos de esta especie han sido observados (R. V.-F.) en la Isla de Lobos, repetidamente en invierno y primavera, presentando ya sea el plumaje de cría o el plumaje invernal.

Comentarios: Especie norteamericana que anida en el extremo norte de Norteamérica y al llegar el otoño boreal emigra a Sudamérica llegando accidentalmente hasta las Malvinas. Fue observado por primera vez en el Uruguay por G. W. Teague, quien lo fotografizó el 4-XII-1947 en la Playa Mansa de Punta del Este.

Calidris canutus rufus (WILSON)
"chorlo rojizo"

Tringa rufa WILSON, 1813, 7, p. 43, pl. 57, fig. 5 (EE.UU. sobre el lado atlántico).

Calidris canutus rufus (WILSON), BENT, 1927, 1, pp. 131-145 (sociología, migraciones, comportamiento reproductor, nidación, descripción de nido, huevos, pollos, plumaje, alimento, etología, voz, reconocimiento de visu, caza, distribución); HELLMAYR y CONOVER, 1948, 1 (3), pp. 166-168 (sinonimia y bibliografía, nota con las características subespecíficas, distribución: cría desde el norte de Tierra Ellesmer hasta el sureste de la Isla Victoria y la península Melville; emigra a lo largo de la costa atlántica de América y más diseminadamente a través del interior a Sudamérica, donde ha sido encontrada en varias localidades dispersas de Perú, Chile, Brasil —Amaracao, Piauh, Setiembre; Iguapé, São Paulo, Noviembre; Río Grande do Sul—; Argentina —Buenos Aires, II, XI-XII y Cabo Espiritu Santo en Tierra del Fuego, II—); TEAGUE, 1955, pp. 51-52 (7 ejemplares observados en el Dpto. de Rocha —Isla Grande de La Paloma— el 14-XII-1951); VAZ-FERREIRA, 1956, pp. 77-77 (observado en el Dpto. de Rocha —Islas de la Coronilla—).

Material examinado: ZVC, A. 69 y 70. Proc.: Isla Verde de La Coronilla, Dpto. de Rocha, 16-II-1953, col. E. Palerm. — ZVC, A. 100 y 101. Proc.: Cabo Polonio, Dpto. de Rocha, 21-IX-1953, col. R. Vaz-Ferreira y B. Orejas. — MNHN, N.º 204. Proc.: Playa Penino, Dpto. de San José, 20-XI-1952, col. E. Gómez-Haedo. — MNHN, N.º 1174 y 1175. Proc.: Playa Penino, Dpto. de San José, 20-XI-1958, col. E. Gómez-Haedo. — MNHN, N.º 1398. Proc.: Playa Penino, Dpto. de San José, 19-IX-1959, col. E. Gómez-Haedo.

Descripción sumaria: Ejemplares capturados en febrero:

Frente: pardo grisáceo; corona y nuca: pardo grisáceo con manchas pardo-gris más oscuro en el centro de algunas plumas; cuello posterior y dorso: pardo-gris con el extremo del raquis de las plumas: pardo; plumas de la rabadilla: gris-pardo con raquis blanquecino en la base y pardo oscuro en el extremo. Una banda gris-pardo oscuro en las proximidades del extremo de las barbas de la parte expuesta de la pluma, extremo de las barbas de esta misma porción blanquecino. Tectrices caudales superiores con bandas transversas irregulares alternativamente gris-pardo oscuro y blanco. Tectrices alares superiores menores: pardo con raquis pardo más oscuro y reborde: pardo blanquecino, medianas y parte de las mayores: pardo-gris con raquis pardo-gris oscuro y rebordes blanquecinos, resto de las mayores con base pardo oscuro y raquis y extremo blanco. Cara superior de las rectrices: pardo plateado con raquis y rebordes blanquecinos. Cara superior de las rémiges: pardo algo más oscuro en las barbas externas, raquis: blanco en casi toda su extensión y pardo en el extremo.

Regiones loreal y auricular: pardo grisáceo con manchas pardo gris más oscuro en el centro de algunas plumas; región superciliar:

con una ceja blanca provista de algunas muy pequeñas manchas gris; esta ceja se extiende desde la parte superior de la base maxilar hasta algo atrás de la región auricular. Mejillas: blancas con pequeñas manchas alargadas pardo-gris; lados del cuello, con la parte posterior semejante en coloración al cuello posterior y la parte anterior semejante a la mejilla. Flancos con la parte anterior superior pardo grisáceo con raquis pardo, antero-inferior: blanco con manchas pardas y la posterior provista de plumas con bandas transversales irregulares alternativamente pardo y blanco.

Mentón y garganta: blanco; cuello anterior: blanco con pequeñas manchas alargadas pardas. Pecho superior con características semejantes al cuello anterior o con bandas transversales irregulares pardas; pecho inferior, vientre, crissum y tectrices caudales inferiores: blanco con muy escasas manchas pardas. Hacia los lados del pecho y del vientre se extiende algo la coloración del flanco superior alares inferiores anteriores: blanco con porciones próximas al borde pardo, y reborde blanco; tectrices alares inferiores posteriores: pardo plateado con una banda algo más oscura en la proximidad del extremo. Cara inferior de las rémiges: plateado pardo con bases de las barbas de la porción proximal de la pluma algo más oscura que la porción distal y totalidad de la extensión de las barbas del exterior de la pluma: pardo grisáceo; raquis: blanco. Cara inferior de las tectrices: plateado pardo con los rebordes blanquecinos.

Pico: negro. Patas: negro. Iris: gris-pardo.

Ejemplares capturados en setiembre:

Difieren de los anteriores por presentar entremezcladas con el plumaje invernal, abundantes plumas residuales del plumaje de cría: en el cuello anterior, pecho y vientre se encuentran plumas con la mitad distal canela-naranja, porción basal: pardo-gris con base blanca y una zona de separación blanca.

En el cuello posterior y dorso: plumas con extremos gris pardo muy oscuro con manchas laterales blancas y base gris.

Sexos y medidas (en mm.) de los ejemplares examinados

| ZVC, A. N.º | sexo | longitud total | ala | cola | tarsos |
|------------------|------|----------------|-----|------|--------|
| 69 | ♀ | 250 | 155 | 61 | 30 |
| 70 | ♂ | 265 | 155 | 62 | 34 |
| 100 | ♂ | 265 | 165 | 62 | 32 |
| 101 | ♂ | 265 | 166 | 62 | 30 |
| MNHN, N.º | | | | | |
| 204 | ♀ | 260 | 162 | 60 | 32 |
| 1174 | ♀ | | 158 | 61 | 31 |
| 1175 | ♂ | | 167 | 62 | 31 |
| 1398 | ♂ | | 157 | 60 | 30 |

Notas: Numerosos ejemplares de esta especie fueron observados por R. V.-F. y E. Palerm en Isla Verde de la Coronilla el 16-II-1953 conjuntamente a los dos ejemplares capturados (ZVC, A. 69 y 70), algunos de ellos se encontraban, en ese período, incapacitados para el vuelo.

Una bandada muy concentrada de más de dos mil ejemplares observada (R. V.-F.) en Barra del Chuy el 26-I-1953.

Comentarios: Se trata de una especie frecuente en la costa oceánica del Uruguay donde permanece durante un período de varios meses; ello hace pensar que nuestro territorio constituye una zona de estación invernal para algunas poblaciones de la especie al término de su desplazamiento hacia el sur.

Steganopus tricolor VIEILLOT

“chorlo blanco nadador”

Steganopus tricolor VIEILLOT, 1819, *32*, pp. 136-137 (basado en “chorlito tarso comprimido” de AZARA, Paraguay); BENT, 1927, *1*, pp. 28-37 (sociología, comportamiento reproductor, nido, descripción de huevos, pollo, plumajes, alimento, etología, voz, distribución); MUS. ARG. C. NAT., 1936, pp. 358-358; HELLMAYR & CONOVER, 1948, *1* (3), pp. 221-224 (sinonimia, bibliografía, distribución: cría desde el sur de Columbia Británica, el centro de Alberta, sur de Saskatchewan y de Manitoba hasta el centro de California, Utah, Colorado, Nebraska, centro de Iowa y noroeste de Indiana. Invierna en las tierras altas de Perú y Bolivia y también en Chile y la Argentina al sur hasta Chubut; accidental —un registro— en las islas Malvinas); TEAGUE, 1955, pp. 27-28 (distribución, 3 ejemplares vistos el 1-IX-1951 y 2 —uno de ellos capturado— el 9-IX-1951 en el Estero de Colonia, Dpto. de Colonia —12 individuos vistos en el Ao. Caballada, Dpto. de Colonia— en Noviembre de 1951).

Phalaropus tricolor OLROG, 1959, pp. 121-121.

Material examinado: MNHN, N.º 1166, 1167 y 1168. Proc.: Laguna del Cisne, Dpto. de Canelones, 25-X-1958, col. E. Gómez-Haedo y E. Gerzenstein. — MNHN, N.º 1220. Proc.: Laguna del Cisne, 29-XI-1958, col. E. Gómez-Haedo. — ZVC, A. 512. Proc.: Laguna del Cisne, 29-XI-1958, col. E. Gerzenstein.

Descripción sumaria (plumaje invernal):

Frente: blanco; corona, nuca, línea media del cuello posterior y dorso superior: ceniza claro. Dorso inferior: pardo ceniciento claro con las plumas bordeadas de blanquecino. Rabadilla y tectrices caudales superiores: blanco. Tectrices alares superiores menores y mayo-

res: pardo con bordes pardo blanquecino; tectrices alares superiores medianas: pardo grisáceo con bordes blanquecinos. Cara superior las rémiges: pardo con raquis pardo blanquecino. Cara superior de rectrices: blanco con marmoraciones pardo claro.

Regiones loreal, malar, superciliar y mejilla: blanco. Una franja de gris blanquecino parte del borde posterior del ojo y se extiende por el cuello lateral hasta confluir con el área ceniza claro del borde posterior. Por encima y por debajo de esta franja el cuello lateral blanco. Flancos: blanco con tintes gris-plata.

Porciones inferiores desde el mentón hasta las tectrices caudales inferiores: blanco puro. Lados del pecho: gris-plata. Tectrices inferiores con base pardo claro y resto blanco. Cara inferior de rémiges: gris-pardo brillante con raquis blanquecinos.

Algunos de los ejemplares capturados presentan en el cuello plumas rojizas del plumaje estival.

Pico: negro. Patas: amarillo verdoso. Uñas: negro. Iris: pardo

Sexos y medidas (en mm.) de los ejemplares examinados

| MNHN, N.º | sexo | longitud total | ala | cola | tarso | dedo medio con uña |
|--------------------|------|----------------|-----|------|-------|--------------------|
| 1166 | ♀ | | 128 | 50 | 32 | 31 |
| 1167 | ♂ | | 122 | 47 | 31 | 31 |
| 1168 | ♂ | | 118 | 48 | 31 | 30 |
| 1220 | ♂ | | 116 | 52 | 32 | 31 |
| ZVC, A. N.º | | | | | | |
| 512 | ♂ | | 123 | 51 | 32 | 30 |

Comentarios: Especie que se reproduce en América del Norte y emigra en el otoño boreal a Sudamérica, llegando hasta el sur de la Argentina. TEAGUE la observó por primera vez en el Uruguay (1-IX-1951, estero del Dpto. de Colonia) y cazó (9-IX-1951) un ejemplar para el Museo de Colonia.

Los integrantes de este género son mucho más nadadores que los de otros géneros de "chorlos" y se distinguen por las expansiones foliáceas de los dedos, parecidas a las que presentan las gaviotas (*Fulica* spp.).

Chionis alba (GMELIN)
 "paloma encantada", "paloma de mar"
 (Lámina III)

Vaginalis alba GMELIN, 1788, 1 (2), p. 705 (basada en descripción de LATHAM, 1785, 3 (1), p. 268, pl. 89, sobre ejemplares de "New Zealand" —error por Islas Malvinas—).

Chionis alba (GMELIN), FREYCINET, 1824, pp. 131-132, pl. 30 (Islas Malvinas); SALVADORI, 1900, pp. 624-625 (Río Gallegos —Patagonia—, en julio); DABBENE, 1910, pp. 213-213 (distribución en Argentina —Río Gallegos, Patagonia; Tierra del Fuego; Islas Orcadas del Sur—); SCOTT & SHARPE, 1910, 2 (2), pp. 234-238, fig. 136 (sinonimia y bibliografía, medidas, descripción transcrita de otros autores); MUS. ARG. C. NAT., 1936, pp. 360-360 (sinonimia, bibliografía, distribución: Océano Atlántico austral al sur del continente americano; Argentina —Islas Malvinas, Tierra del Fuego, Santa Cruz—); MURPHY, 1936, 2, pp. 1000-1006 (sinonimia, nombres vulgares, caracteres de adultos, jóvenes, y nido, notas ecológicas, notas etológicas); HELLMAYR & CONOVER, 1948, 1 (3), pp. 240-241 (sinonimia, bibliografía, distribución: cría en Georgia del Sur, Sandwich del Sur, Orcadas del Sur, Shetland del Sur y en varias islas del archipiélago antártico; se encuentra regularmente en las Islas Malvinas, los islotes Diego Ramírez, el Estrecho de Magallanes y la costa de Patagonia del sur); VAZ-FERREIRA, 1952, pp. 249-252 (fotografía, observaciones en julio, agosto, setiembre, octubre y noviembre en las islas Encantada, del Marco, Isote e Isla de Lobos —Uruguay— folklore, mención de un ejemplar procedente de la Isla de Lobos); ESCALANTE, 1959 (dos ejemplares vistos en Punta del Este, Dpto. de Maldonado, el 18-VI-1958, uno de ellos capturado).

Material examinado: ZVC, A. 53. Proc.: Isla de Lobos, Dpto. de Maldonado, 14-VII-1951, col. R. Vaz-Ferreira y E. Palerm. — MNHN, N.º 1550. Proc.: Isla de Lobos, Dpto. de Maldonado, 30-IX-1960, col. A. Ximénez.

Descripción sumaria: Plumaje enteramente blanco con plumón grisáceo que no es visible desde la superficie. Cabeza provista de regiones desnudas en las proximidades del pico y especialmente por detrás de su comisura. Estas regiones presentan carúnculas papiladas de color, en algunas partes verdoso y en otras rosado.

Patas: verdoso. Iris: pardo.

Sexos y medidas (en mm.) de los ejemplares examinados

| ZVC, A. N.º | sexo | ala | cola | tarso | dedo medio con uña | culmen |
|-------------|------|-----|------|-------|--------------------------|--------|
| 53 | ♀ | 227 | 100 | 40 | 45 | 33 |
| MNHN, N.º | | | | | | |
| 1550 | ♀ | 242 | 121 | 43 | 51 | 31 |

Notas: La presencia de *Chionis alba* en las islas de nuestras costas ha sido registrada por uno de nosotros (R. V.-F.) en las islas litorales

oceánicas todos los años desde 1950 a 1956 en los meses de junio y agosto; algunos de dichos años se vieron también en los meses de mayo, setiembre, octubre y noviembre.

Frecuentemente se ve a la "paloma de mar" en grupos de cinco individuos sobre las rocas de la orilla del agua, entre los tipos de *Arctocephalus australis* (ZIMMERMANN) o de *Otaria byronia* (BLAINVILLE). Realiza constantes desplazamientos rápidos en que se alimentan de partículas alimenticias, pero permanece en las mismas zonas durante algunas horas.

A veces, especialmente en la Isla del Marco, se ven repentinamente sobre el extremo de torreones graníticos.

En vuelo se asemejan a palomas domésticas, ya que describen círculos en el aire muy semejantes a los de éstas.

Comentarios: En general existe dificultad para procurarse ejemplares de "paloma de mar" por provocar la captura reacción desagradable y de crítica severa por parte de los "loberos", que consideran en algún grado carácter de animal "encantado".

Chionis es un género de afinidades dudosas aunque indudablemente está conectado a los Charadriidae, cuya área de distribución está centrada por el continente antártico del cual se aleja poco. La especie que vive *Chionis alba* en el Uruguay es una de las más extendidas hacia el norte a que alcanzan los representantes del género en la zona de dispersión normal de invierno.

Catharacta skua BRÜNNICH
"gaviota brava", "gaviota parda"

Catharacta skua BRÜNNICH, 1764, pp. 33-33 (Faroer & Iceland).

Material examinado: ZVC, A. 422. Proc.: Isla de Lobos, Dpto. Maldonado, 28-VIII-1957, col. I. Ximénez.

Descripción sumaria: Frente, corona, nuca y cuello pardo oscuro con las plumas bordeadas de pardo claro y, en el lado posterior, con raquis pardo claro; dorso, rabadilla, tectrices superiores y cara superior de las rectrices: pardo oscuro. Tectrices alares superiores: pardo oscuro con ápice, en algunas de ellas, pardo claro. Cara superior de las rémiges: pardo muy oscuro con la punta de las plumas y los raquis blanquecinos.

Región loreal con una estrecha estría anterior pardo clara y porción posterior pardo oscuro, color que se continúa hacia el cuello lateral de color transitivo entre el cuello anterior y el posterior. Flancos: pardo grisáceo.